

Pobieranie próbki kału do badań w kierunku wykrywania pałeczek jelitowych (osoby chore)

Pobieranie próbki kału do „kałówki”

- Kał należy oddać do dokładnie umytego i wyparzonego pojemnika, lub pieluchy (u dzieci).
- otworzyć kałówkę/ probówkę.
- ze świeżo oddanego kału, łyżką, znajdującą się w pojemniku, pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego, a w przypadku kału płynnego ok. 1/3 kałówki.
- próbki kału pobierać z kilku miejsc, uwzględniając miejsca patologiczne (np. krew, śluz, ropę).
- zamknąć dokładnie kałówkę i podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.
- próbkę dostarczyć do laboratorium w ciągu kilku godzin od momentu pobrania, nie później niż 24 godziny.

Pobieranie próbki kału do probówki z podłożem transportowym:

- bawełnianą wymazówkę zanurzyć w kale (w kilku miejscach) i kilkakrotnie, delikatnie obrócić i włożyć do probówki, tak aby nie zabrudzić ścian probówki i by wymazówka znalazła się w miękkim podłożu na dnie probówki.
- próbki kału pobierać z kilku miejsc, uwzględniając miejsca patologiczne (np. krew, śluz, ropę).
- Zamknąć dokładnie probówkę i podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.
- probówki dostarczyć do laboratorium, nie później niż 72 godziny od pobrania pierwszej próbki kału.
- do momentu dostarczenia do laboratorium, próbki przechowywać w temperaturze $+2^{\circ}\text{C} \div +8^{\circ}\text{C}$.

UWAGA! Na bawełnianej watce wymazówki musi być widoczny kał.

4.3. Pobieranie wymazu z odbytu.

UWAGA! W przypadku braku możliwości pobrania próbki kału, u osób chorych, należy pobrać wymaz z odbytu.

- otworzyć probówkę z podłożem transportowym.
- bawełniana wymazówkę zwilżyć sterylną wodą i umieścić za zwieraczem odbytu, obrócić i wyjąć; sprawdzić czy widoczny jest pobrany materiał, jeśli nie czynność powtórzyć.
- wymazówkę umieścić w podłożu transportowym, zamknąć, podpisać imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.

Kał do badań należy pobrać przed (ewentualnym) podjęciem leczenia przeciwbakteryjnego lub minimum po 7 dniach od zakończenia antybiotykoterapii.